

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」 を服用される患者さんへ

透析または肝疾患治療を受けている方の
かゆみを改善するお薬です。

お薬の飲み方

- 1日1回、夕食後または就寝前の決められた時間に服用してください。
- このお薬は、水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、唾液と一緒に飲みこんでください。普通のお薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- グレープフルーツジュースと一緒に摂らないようにしてください。
- 服用する直前にシートから取り出して飲んでください。

次のような方は、服用前に必ず医師
または薬剤師にご相談ください。

- 以前にお薬を使用して、発疹やかゆみなどが出たことがある方。
- 妊娠または授乳中の方。
- 現在服用しているお薬がある方。(薬局で買ったお薬を含めて)

▶ 飲み忘れた場合

夕食後に服用している方は、気づいたのがその日の就寝前であれば、1回分を飲んでください。それ以外の場合は、飲み忘れた分は1回分とばし、次の通常の服用時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。

◀ 保管方法

光が直接当たる場所や湿気の多い場所を避けて、室温で保管してください。

このような症状に気づいたら、
医師または薬剤師にご相談ください。

●なかなか寝付けない



●便秘になる
●おしっこが近くなる※



※おしっこが近くなる症状は、肝疾患治療を受けている方に気をつけてほしい症状です。

●眠気がする



●めまいがする



眠気やめまいなどがあらわれる場合があるため、車の運転や危険を伴う機械を扱わないようにしてください。

これらの症状は、飲み始めてから、透析を受けている方は2週間以内に、肝疾患治療を受けている方は4週間以内にあらわれることが多いので、特に気をつけてください。また、このお薬を長い間飲み続けている場合にも、体調の変化によってこれらの症状があらわれることがあります。

気になる症状があらわれた際には、医師または薬剤師にすぐにご相談ください。

沢井製薬株式会社