


ラモトリギン錠25mg「サワイ」
服薬指導シート成人用 **B**

●バルプロ酸ナトリウムを服用していない
●ラモトリギン錠「サワイ」の代謝を促進する薬剤[※]との併用療法を行っているもしくは併用している患者さん用
※カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤

お薬を服用中に、**発疹**や**下記のような症状**が現れた場合は、**重篤な皮膚障害**になる可能性がありますので、**医師または薬剤師に相談**してください。



↓このカードをはがして必ず常に携帯してください。

次回の診察時には
必ず医師および薬剤師に
このシートをご提示ください。

沢井製薬株式会社

※このカードは必ず常に携帯していただきます。
もし、裏面のかかりつけ医師または薬剤師に相談していただきます。
障害に進展する場合があります。いかなる発疹であれ発疹が確認され
ラモトリギン錠「サワイ」を服用していると、発疹が起る場合があります。ラモトリギ
ン錠「サワイ」を服用している患者さんへ
患者さんより本カードの提示を受けた医師・薬剤師の先生へ
を見てください。
かかりつけの病院以外で診察を受ける場合にも、医師にこのカード
医師または薬剤師に連絡し、医師の指示に従ってください。
ラモトリギン錠「サワイ」を飲んでる間に発疹に気づいた場合は、
ラモトリギン錠「サワイ」を服用する患者さんへ
— 服薬カード —

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

1 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用 B

GULAM01BPV01
2018年6月 ©S

ラモトリギン錠「サワイ」を服用する患者さんへ

1 週目

1日1回2錠を服用してください

どちらかに○をつけてください(朝 または 夜)

1 日目	()	()	1 錠
2 日目	()	()	2 錠
3 日目	()	()	3 錠
4 日目	()	()	4 錠
5 日目	()	()	5 錠
6 日目	()	()	6 錠
7 日目	()	()	7 錠

次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

2 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用 B

ラモトリギン錠「サワイ」を服用する患者さんへ

2 週目

1日1回2錠を服用してください

どちらかに○をつけてください(朝 または 夜)

8 日目	()	()	8 錠
9 日目	()	()	9 錠
10 日目	()	()	10 錠
11 日目	()	()	11 錠
12 日目	()	()	12 錠
13 日目	()	()	13 錠
14 日目	()	()	14 錠

次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

3 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用 B

ラモトリギン錠「サワイ」を服用する患者さんへ

3 週目

1日2錠を、1日2回服用してください

朝・夜

15 日目	朝	()	夜	()	15 錠
16 日目	()	()	()	()	16 錠
17 日目	()	()	()	()	17 錠
18 日目	()	()	()	()	18 錠
19 日目	()	()	()	()	19 錠
20 日目	()	()	()	()	20 錠
21 日目	()	()	()	()	21 錠

次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

4 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用 B

ラモトリギン錠「サワイ」を服用する患者さんへ

4 週目

1回2錠を、1日2回服用してください

朝・夜

22 日目	朝	()	夜	()	22 錠
23 日目	()	()	()	()	23 錠
24 日目	()	()	()	()	24 錠
25 日目	()	()	()	()	25 錠
26 日目	()	()	()	()	26 錠
27 日目	()	()	()	()	27 錠
28 日目	()	()	()	()	28 錠

5週目からは通常の薬シート(PTPシート)での服薬となります。
シートでの服薬はこれで終わります。
次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

