

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

4 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用C

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

3 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用C

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

1 2 週目

ラモトリギン錠25mg「サワイ」 服薬指導シート成人用C

GULAM01CPV01
2018年6月©5

ラモトリギン錠25mg「サワイ」

服薬指導シート成人用 C

- バルプロ酸ナトリウムを服用していない
- カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシリン、ロピナビル・リトナビル配合剤を服用していない
- ラモトリギン錠「サワイ」の単剤療法を行っている患者さん用
- ラモトリギン錠「サワイ」の代謝に影響を及ぼさない薬剤[※]との併用療法を行っているもしくは併用している患者さん用

※ゾニサミド、ガバペンチン、トピラマート、レベチラセタム、リチウム、オランザピン、アリピプラゾール、プレガバリン、シメチジン、ペランパネル、ラコサミド

お薬を服用中に、**発疹や下記のような症状**が現れた場合は、重篤な皮膚障害になる可能性がありますので、医師または薬剤師に相談してください。

↓ このカードをはがして必ず常に携帯してください。

次の診察時には必ず医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

沢井製薬株式会社

4 週目

1日あたり2錠を1回 または1錠ずつ2回 服薬してください

22 日目 1 2

23 日目

24 日目

25 日目

26 日目

27 日目

28 日目

次の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。5週目からは通常の服薬シート(TPシート)での服薬となります。

3 週目

1日あたり2錠を1回 または1錠ずつ2回 服薬してください

15 日目 1 2

16 日目

17 日目

18 日目

19 日目

20 日目

21 日目

次の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

1 2 週目

1日1回1錠を服用してください

どちらかに○をつけてください(朝 または 夜)

1 日目 1 2

2 日目

3 日目

4 日目

5 日目

6 日目

7 日目

8 日目

9 日目

10 日目

11 日目

12 日目

13 日目

14 日目

次の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

※このカードは必ず常に携帯してください。

患者さんより本カードの提示を受けた医師・薬剤師の先生へ
患者さんはラモトリギン錠「サワイ」を服用しています。ラモトリギン錠「サワイ」を服用すると、発疹が起る場合があります。重篤な皮膚障害に進展する場合があります。いかなる発疹であれ発疹が確認され、かかりつけの病院以外で診察を受ける場合にも、医師にこのカードを見てください。

医師または薬剤師に連絡し、医師の指示に従ってください。

ラモトリギン錠「サワイ」を飲んでいない間に発疹に気づいた場合は、

