

# トアラセット配合錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

このお薬には、**トラマドール**と**アセトアミノフェン**という痛みをおさえる2つの有効成分が配合されています。**これらの成分が含まれている他の薬といっしょに服用しないようにしてください。**

**アセトアミノフェン**は、市販の**解熱鎮痛薬**や**総合感冒薬**に含まれていることがありますので、服用の際はとくに注意してください。

## お薬を飲むときの注意

- 慢性疼痛には1回1錠(1日4回)、抜歯後の疼痛には1回2錠を服用するのが一般的です。医師の指示どおりに服用してください。
- 1回2錠、1日8錠より多く服用しないでください。また、服用の間隔は4時間以上あけてください。
- 誤って多く飲んでしまった場合は、すぐに医師や薬剤師にご相談ください。
- お薬の服用中は、**飲酒しないでください**。副作用があらわれやすくなり危険です。
- **自己判断で服用を中止しないようにしてください。**

## 副作用について

**便秘** 下剤をいっしょに服用する場合があります。

**吐き気・嘔吐** 飲み始めの時期にあらわれることがあるので、吐き気止めをいっしょに服用する場合があります。症状がおさまらない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**眠気** トアラセット配合錠「サワイ」を服用しているときは、**自動車の運転や危険を伴う機械の作業などは避けてください**。しばらくしても眠気が改善しない場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## お薬の 保管方法

- お子さまの手の届かないところに保管してください。
- お薬が残った場合は、保管せずに廃棄してください。
- **他の人にお薬を絶対に渡さないようにしてください。**

服用中になにか気になることがありましたら  
医師または薬剤師に相談してください