

その他の注意点

- 次のような症状が長く続くときは、医師に相談してください。

不正出血*、吐き気、嘔吐、頭痛、生理間隔の異常(39日以上)、
上腹部の痛み、乳房が張る、かたまり状の出血があるなど

※不正出血…月経と違う時期におきる出血

- このお薬は避妊を目的に使用することはできません。
- 副作用の早期発見のためにも、定期的に診察をうけましょう。
- 他の診療科や医療機関を受診するときは、このお薬を飲んでいることを医師、薬剤師に伝えてください。

医療機関名

沢井製薬株式会社


フリウェル® 配合錠LD/ULD「サワイ」を 服用される患者さんへ



このお薬は、黄体ホルモンと卵胞ホルモンという2種類の女性ホルモンを補充することにより、月経時の疼痛を軽減します。

お薬の飲み方

1日1錠を、21日間連続して飲み、その後7日間は
飲むのを休みます。




このお薬をはじめて服用するときは、月経がはじまって
1～5日目から飲み始めてください。

- 7日間のお休みの期間はケースのキリトリ箇所をめぐって忘れないようにしましょう。



カレンダーなどに、お薬を飲む期間やお休みする期間を記入しておくとう安心です。



(例)フリウェル® 配合錠LD「サワイ」

毎日1錠を同じ時間帯に飲みましょう。

飲む時間をあらかじめ決めておき、毎日同じ時間帯に飲むようにしましょう。

例

朝起きたとき

夕食後

夜寝る前

など

食事の影響をうけないため、食後でも空腹時でもいつでもかまいません。
ご自身が飲み忘れにくい時間を決めて、服用するようにしましょう。

飲み忘れたとき

①その日のうちに飲み忘れに気づいたとき

気づいたときにすぐに飲みましょう。次の日から、いつもお薬を飲んで
いる時間帯に飲み続けてください。

②翌日に飲み忘れに気づいたとき

気づいたときに前日飲み忘れた分のお薬を飲み、当日のお薬はいつも
お薬を飲んでる時間帯に飲みましょう。次の日からはスケジュール
どおりに服用してください。

前々日	前日	当日	翌日
	飲み忘れ	 	

③2日以上飲み忘れたとき

気づいたときに前日分の1錠を飲み、当日のお薬はいつもお薬を飲んで
いる時間帯に飲みましょう。前々日の分は飲まないでください。
次の日からはスケジュールどおりに服用してください。

前々日	前日	当日	翌日
飲み忘れ	飲み忘れ	 	



1日に2錠より多く飲むことはありません。

服用中の注意点

このお薬により、血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)があらわれ
ることがあります。

次のような場合は、すぐに医師に相談してください。

- 足の痛み、むくみ ●手足に力がはいらぬ・^{まひ}麻痺
- 息切れ、押しつぶされるような胸の痛み ●激しい頭痛
- 舌のもつれ・しゃべりにくい
- 視力障害(見えにくいところがある、視野がせまくなる)
- めまい など

突然の強い症状としてあらわれた場合は、飲むのをやめてすぐに医療機
関を受診してください。

症状が軽い場合も、血栓症の疑いがあるためすぐに医師に相談してくだ
さい。

血栓症にならないために

・禁煙しましょう!

喫煙は血栓症(静脈血栓症、肺塞栓症、心筋梗塞、脳
卒中など)の副作用の危険性を高めることがわかっ
ています。



・適度に体を動かしたり、こまめに水分をとりましょう。

長時間同じ姿勢を続けたり、水分が不足したりすると血栓症がおこ
りやすくなります。