

ミルタザピン錠・OD錠「サワイ」を 服用される患者さんをご家族の方へ

ご家族の方へ

ご家族の方は、死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来すなどの患者さんの行動の変化や、うつ症状などのもともある病気の症状が悪化する危険性について、医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察し、患者さんの状態に変化がみられた場合には、医師に連絡してください。

また、患者さんご自身も、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

飲み始める前の注意点

7～17歳の大きいうつ病性障害のある人がこの薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったという報告があります。18歳未満の大きいうつ病性障害のある人は、医師と十分に相談してください。

飲み方の注意点

- この薬は、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で**1日1回 就寝前**に飲んでください。
- 飲み忘れた場合、気がついた時に、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の服用時間に1回分を飲んでください。**決して2回分を一度に飲まないでください。**

— OD錠を服用される患者さんへ —

この薬は、口の中で速やかに溶けます。

- ・水なしで飲むことができます。唾液を含ませ舌で軽く押しつぶして、唾液と一緒に飲みこんでください。
- ・普通の薬と同じように水またはぬるま湯で飲むこともできます。

※どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

服用時の注意点

1 この薬は、最初は少ない量から飲み始めて、患者さんに適切な量に調整していきます。症状を改善するためには、決められた量のお薬を続けて服用することが大切です。

2 体調がよくなったと自己判断して服用を中止したり、量を減らしたりすると、些細なことでも心配になる、いらいら、あせりなどの症状があらわれることがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

3 次のような態度や行動をとることがあります。

- 不安になる
- いらいらする
- あせる
- 興奮しやすい
- 発作的にパニック状態になる
- ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す
- 敵意を持つ
- 攻撃的になる
- 衝動的に行動する
- じっとしていることができない
- など

これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。

この薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

4 うつ病やうつ状態の人は症状として死んでしまいたいと感じることがあります。この薬を飲んでいる間、特に飲み始めや、飲む量を変更した時に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなることがあるので、このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。

5 あらわれやすい副作用として、眠気、口が渇く、倦怠感といった症状があります。また、体重が増えることがあります。このような症状に気づいたら、医師または薬剤師に相談してください。

6 眠気、めまいなどがおこることがあるため、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。

7 この薬には一緒に飲んではいけない薬や一緒に飲む時には注意すべき薬があります。そのため、**他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。**また、薬の効果に影響を与えるため、飲酒は控えるようにしましょう。

! **誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師にご連絡ください。**