

2週間服用


1週間休薬

# カペシタビン錠 300mg「サワイ」を服用される方へ

大切な注意です。お薬を服用する前に必ずお読みください。

## 治療スケジュール

14日間（2週間）お薬を続けて飲む服用期間の後に、7日間（1週間）お薬を飲まない休薬期間があります。治療は、服用期間と休薬期間を繰り返しておこないます。



※治療スケジュールは、体の状態や副作用により変更されることがあります。

## 服用方法

カペシタビン錠「サワイ」は、1日2回、**朝夕の食後30分以内を目安**に水またはぬるま湯で飲んでください。

### 飲み忘れた場合

次の回から決められたとおりの服用を始めてください。飲み忘れたお薬を、絶対に次の分と一緒に飲まないようにしてください。

**2回分を一度に飲むと副作用が強くあらわれるおそれがあります。**

### 間違えて多く飲んでしまった場合

すぐに担当医師または薬剤師に連絡してください。

カペシタビン錠「サワイ」と絶対に一緒に服用してはいけないお薬や、飲み合わせに注意が必要なお薬があります。

## ！一緒に服用してはいけないお薬

### テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

※服用していた場合は、少なくとも7日間以上の間をあけます。

## 飲み合わせに注意が必要なお薬

- ワルファリンカリウム（血液を固まりにくくするお薬）
- フェニトイン（てんかんのお薬）
- トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤（抗がん剤）

## 注意する症状

次のような症状があらわれたら、  
担当医師に連絡してください。

▶発熱がある



▼吐き気が続く、  
頻回の嘔吐



◀激しい下痢、  
頻回の軟便



次のような症状があらわれたら、  
受診時に担当医師にお知らせください。

▶手や足にしびれ、  
ヒリヒリ・チクチク感、  
痛み、赤く腫れる  
といった症状がある  
(手足症候群)



◀口内炎が  
できる



これら以外にも、気になる症状があらわれた場合には、担当医師や  
薬剤師に連絡してください。

## お薬の保管

直射日光のあたるところや高温多湿になるところは避けて、室温で保管してください。他の人が間違えて飲むことのないよう、特に小さいお子さんの手の届かないところに保管してください。