

## エムアルエスエー 【MRSA】とは？

MRSAは黄色ブドウ球菌おうしよく きゅうきんの一種で、「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌」とよばれる細菌です。高齢者など抵抗力の弱い人が感染すると、重い感染症の原因となります。MRSAは普段使用している抗菌薬の多くが効かないため、適切な治療が必要です。

なお、健康な人では、症状があらわれても重くなることはありません。

## 【MRSA感染症】とは？

MRSAが傷口や肺などで増えてしまうことを、MRSA感染症といいます。MRSA感染症をおこすと、高熱がでたり傷口が膿うみんでしまったり、咳が続き、息苦しいなどの症状がみられます。

医療機関名

沢井製薬株式会社

# リネゾリド<sup>®</sup>錠 600mg「サワイ」を 服用される患者さんとそのご家族の方へ

このお薬は、感染症の原因となっている細菌の増殖を抑えます。  
特に、エムアルエスエーMRSAという細菌による感染症の場合に使用されます。

## お薬の服用方法

### 1日2回、1回1錠ずつ服用します。

※12歳未満の小児は、飲み方が体重によって異なります。  
医師の指示どおりに服用してください。

▶医師の判断により、服用する量や回数が変わることがあります。必ず医師の指示に従ってください。

## 服用前の注意点

次に該当する場合には、このお薬を服用する前に、  
医師・薬剤師の先生にご相談ください。

- これまでにお薬を使用して、発疹やかゆみなどのアレルギー症状が出たことがある
- 貧血や白血球減少症、汎血球減少症、血小板減少症などの骨髄抑制があるといわれている
- 腎臓に重い障害がある
- 肝臓に障害がある
- (12歳以上の方で)体重が40kg未満である
- 現在、服用しているお薬がある
- 妊娠中または妊娠している可能性がある
- 授乳中である

## 服用する際の注意点

- ▶ 医師の指示なしに、自分の判断で服用をやめないでください。途中でお薬をやめると、症状が悪化・再発してしまふことがあります。
- ▶ 錠剤はシートから取り出して、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で服用してください。
- ▶ 飲み忘れた場合、気がついたときにできるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに、次の服用時間に1回分を服用してください。**絶対に2回分を一度に服用しないでください。**
- ▶ 間違えて多く服用してしまった場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

- ▶ チラミンが多く含まれる飲食物  
(例：チーズ、ビール、赤ワイン)  
を多量にとらないでください。  
血圧の上昇や、動悸がおこることがあります。



## お薬の保管について

- ▶ お薬は、小さいお子さんの手の届かないところに保管してください。
- ▶ 光、高温、湿気を避けて保管してください。

## 副作用について

このお薬を服用した後、次のような症状があらわれたら、**すぐに医療機関を受診してください。**



鼻血、歯ぐきからの出血、  
息切れ、青あざ



視力の低下、目のかすみ、  
色覚の異常、視野が欠ける



貧血(たちくらみ、動悸など)



激しい腹痛や下痢、  
便に血が混じる

### — そのほかの症状 —

- 吐き気・嘔吐、全身がだるい、呼吸数の増加
- めまい、呼吸困難、全身がかゆみを伴い赤くなる、**蕁麻疹**じんましん
- 発熱、咳、たんが出る ● 尿量の減少、手足や顔のむくみ

これら以外の副作用があらわれる場合もありますので、気になる症状があらわれた際には、医師または薬剤師にすぐにご相談ください。