

シロドシンOD錠「サワイ」を服用される方へ

前立腺肥大症にともなう排尿障害の治療薬です

前立腺肥大症とは

前立腺は、加齢によって大きくなることが知られており、次のような症状があらわれます。

- おしっこが出にくい
- おしっこの勢いが弱い
- トイレの間隔が近い
- 夜中に何度もトイレに起きる



👉シロドシンOD錠「サワイ」は、このような症状を改善します。

主な副作用は

- 射精時の精液量が少なくなる（射精障害、逆行性射精）
- 下痢や軟便になる
- 口の中が渇く
- 鼻がつまる
- めまいやふらつきがおこる
 - ➡高い場所での作業や、自動車の運転など危険を伴う作業を行うときは、十分に注意してください。

気になる症状があらわれたときは、主治医にご相談ください。

〈ウラ面もお読みください〉

射精障害とは

せい かん 精管（精液がとおる管）、せい のう 精嚢（精液を溜める場所）、ぼう こう 膀胱出口の筋肉の収縮が抑えられることで、精液が尿道に送り出されず、射精時の精液量が減少したり、出なくなったりする現象です。膀胱出口の筋肉がゆるんで、射精時に精液が膀胱内へ流れ込むこともあります（逆行性射精）。膀胱内に流れ込んだ精液は、その後おしっこと一緒に排出されます。
なお、射精障害は、ED（勃起障害）ではありません。

射精障害がおこったら

健康に害を及ぼすものではありませんが、精液量の減少が気になる方や、子どもを望む方は、医師にご相談ください。
休薬すれば症状は回復します。服用を継続しても、回復することがあります。

その他に気をつけたいこと

白内障などの眼科手術を受ける予定のある方は、眼科の医師にシロドシンOD錠「サワイ」を服用していることをお伝えください。

