

アプレピタントカプセル「サワイ」を服用される患者さんへ

お薬を服用する前に、必ずお読みください

化学療法を受ける方の吐き気や嘔吐をおさえるお薬です。
このお薬には **125mg** と **80mg** の2種類があります。
以下の飲み方のおりに、3日間続けて服用してください。

お薬の飲み方

1日目

化学療法薬投与開始の
1時間～1時間30分前に、
125mgカプセルを**1個**服用し
てください。

▼セットシート

アプレピタントカプセルセット「サワイ」 3日分

1日目	月 日 ()
	 125mg
化学療法薬投与の 1時間～1時間30分前に服用	
2日目	月 日 ()
	 80mg
午前中に服用	
3日目	月 日 ()
	 80mg
午前中に服用 シートを切らないでください	

▼125mgシート

アプレピタントカプセル125mg「サワイ」

月 日 ()
 125mg
化学療法薬の投与1日目に服用 してください 化学療法薬を投与する1時間～ 1時間30分前に服用してください

2日目

3日目

午前中に、**80mg**カプセルを
1個服用してください。

※食前でも食後でもかまいません

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」

月 日 ()
 80mg
化学療法薬の投与2日目以降に 服用してください 午前中に服用してください

アプレピタントカプセル80mg「サワイ」

月 日 ()
 80mg
化学療法薬の投与2日目以降に 服用してください 午前中に服用してください

80mgシート▶

※3日分がセットになっているシートと、
用量別のシート(125mg／80mg)があります。

- 吐き気や嘔吐がおこっていても、医師の指示に従って正しく服用してください。
- 治療内容や症状によっては、4日目以降も服用する場合があります。

アプレピタントカプセル「サワイ」には、絶対に一緒に服用してはいけ
ないお薬や、飲み合わせに注意が必要なお薬があります。



一緒に服用してはいけないお薬

ピモジド

現在、服用しているお薬やサプリメントなどがある方は、
担当の医師や看護師、薬剤師にお伝えください。

副作用について

以下のような症状があらわれたときは、すぐに担当の医師や看護師、
薬剤師に連絡してください。

- 全身の発疹、息苦しさ、唇や喉^{のど}のはれ
- 発熱、全身の赤い斑点や水ぶくれ、目の充血、口内炎
- お腹の激しい痛み、血を吐く、血の混じった便が出る

化学療法中は、様々な副作用があらわれることがあります。

このほかにも気になる症状があれば、医師や看護師、薬剤師に相談して
ください。

連絡先