

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」を 服用される患者さん・ご家族の方へ



風邪症状に 注意しましょう

メトトレキサートカプセル「サワイ」の服用中には、感染症による肺炎や間質性肺炎^{*}といった重い副作用があらわれることがあります。

「風邪かな?」と感じたときには服用を一時中止して、主治医に相談してください。

※肺の間質といわれる部分が炎症を起こしている肺炎のこと

肺炎

こんな症状をチェック!

- 風邪のような症状
(発熱・せき・のどの痛み・頭痛など)
- 息切れ、息苦しさ
など



冬の風邪にはとくに注意しましょう

沢井製薬株式会社

主治医に相談しましょう

このお薬による肺炎では、症状が急激に悪化する場合があります、注意が必要です。

服用中に風邪のような症状があらわれたときには、服用を一時中止して、主治医に相談してください。

また、主治医に連絡が取れない場合は、メトトレキサートカプセル「サワイ」と他に服用中のお薬を持って、近くの医療機関を受診してください。



風邪の予防も大切です！

このお薬を服用中は、風邪から重い肺炎に発展するおそれがあります。こまめに手洗いやうがいをする、マスクをする、人ごみを避けるなど、風邪の予防を心がけましょう。

また、高齢の方は、肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種もご検討ください。

