

メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」を

服用される患者さん・ご家族の方へ



夏の暑さに 注意しましょう

夏は高温、高湿度、強い日差しなどにより、脱水症状をおこしやすい季節です。脱水状態になるとおしっこが出にくくなり、メトトレキサートカプセル「サワイ」の排泄が悪くなるため、副作用がおこりやすくなります。

以下のような症状に気がついたら、服用を一時中止して、主治医に相談してください。

脱水症状

こんな症状をチェック!

- 口が異常にかわ渴く
- 疲れやすい、全身がだるい
- めまい、立ちくらみ
- はきけ、食欲不振
- おしっこの量・回数が急に減る

こまめに水分を補給してください



沢井製薬株式会社

暑さだけじゃない、脱水の原因

脱水をひきおこす原因は、夏の暑さだけではありません。

脱水症状を見落とさないように、体調の変化に気をつけましょう。

主な脱水の原因

下痢
嘔吐
食欲不振
熱中症 など



高齢の方はとくに注意しましょう

高齢の方は、喉の渴きを自覚しにくかったり、普段の食事が不足しがちな傾向があり、日頃から脱水症状をおこしやすいとされています。

また、徐々に腎臓の働きも低下してくるため、薬の影響を受けやすくなります。ご家族の方を含め、日々の体調管理を心がけてください。



体内の
水分量が
少ない

喉の渴きを
感じにくい
水分摂取量が
少ない

食事の量が
少ない