

# 慢性疾患でセレコキシブ錠「サワイ」を服用される患者さんへ

セレコキシブ錠「サワイ」は下記の慢性疾患によって起こる関節や筋肉などの腫れや痛みをおさえます。

かんせつ  
関節リウマチ

へんけいせいかんせつしょう  
変形性関節症


ようつうしょう  
腰痛症

かたかんせつしゅういせん  
肩関節周囲炎

けいけんわんしょうこうくふん  
頸肩腕症候群

けんえん けんしょうえん  
腱炎・腱鞘炎

腫れや痛みは、痛みのもとであるプロスタグランジンと呼ばれる物質が、炎症部位から放出されることにより起こります。セレコキシブ錠「サワイ」は、プロスタグランジンをつくる物質(シクロオキシゲナーゼ-2)の働きをおさえることで、腫れや痛みをやわらげます。



このお薬を飲む前に、下記の項目にひとつでもあてはまるものがありましたら、必ず主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、発疹や喘息症状が出たことがある。
- 胃潰瘍などの胃腸の病気がある。
- 心臓、肝臓または腎臓の病気がある。
- 以前に心臓のバイパス手術などを受けたことがある。
- 現在、妊娠中または授乳中である。
- 現在、他のお薬(市販薬を含む)を飲んでいる。



## 服用する際の注意点

- 包装シート(PTPシート)から取り出して、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 通常、朝食後と夕食後の1日2回飲むお薬です。
- 飲み忘れに気がついた際は、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回とばして、次の服用時に1回分を飲んでください。決して2回分を1度に飲まないでください。
- 症状がひどいからといって、ご自分の判断で決められた量よりたくさん飲まないでください。副作用が起こりやすくなる場合があります。また、症状がおさまった場合でも、ご自分の判断でお薬を飲むのをやめたり、お薬の量を調節しないで、主治医に相談してください。
- このお薬は、症状をやわらげるお薬であり、病気そのものを治すものではありません。また、長期間服用することで、副作用が起こりやすくなることもあります。症状がおさまってきたら、服用を続けるかどうかを主治医に相談してください。
- 飲みはじめて2~4週間たっても、あまり効果がみられないときには、主治医に相談してください。
- 服用中にめまいや傾眠などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業を行う場合には、十分注意してください。
- ご自分のお薬を、他の人には絶対にあげたりしないでください。

### 副作用について

#### 主な副作用

- 腹痛
- 下痢
- 口内炎
- 発疹ほっしん
- 傾眠(うとうとする)
- など

セレコキシブ錠「サワイ」を服用中に次のような症状があらわれた場合には、お薬を飲むのを中止して、すぐに主治医に相談してください。

- 胸が痛い(数分で消失する痛みでも、主治医に相談してください)
- しゃべりにくい
- 体の片側が麻痺する、手足が動かしにくい・しびれるまひ
- 息切れ、息苦しい



他にも気になる点などがありましたら、  
主治医または薬剤師に相談してください。

