

急性疾患でセレコキシブ錠「サワイ」を服用される患者さんへ

セレコキシブ錠「サワイ」は炎症にかかわる物質の生成をおさえ、腫れや痛みを改善します。

急性疾患（手術、けが、抜歯の後の痛み）に対して、下記のお薬が処方されました。
[どちらかの□に✓印を付けてください。]

お薬の種類

- セレコキシブ錠100mg「サワイ」 セレコキシブ錠200mg「サワイ」


お薬の飲み方

- 毎日服用 頓用

初回のみ1回（ ）錠を飲み、
2回目以降は1回（ ）錠を飲んでください。
※服用の間隔は、**6時間以上**あけてください。



投与例



頓用の場合は

初回のみ400mg、2回目以降は200mgを服用してください。
つぎの服用までには**6時間以上**の間隔をあけてください。
また、**1日2回まで**の服用にしてください。

医師・歯科医師・薬剤師の指示にしたがって、服用してください。

このお薬を飲む前に、下記の項目にひとつでもあてはまるものがありましたら、必ず主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を飲んで、^{ほっしん}発疹や喘息症状が出たことがある。
- 胃潰瘍などの胃腸の病気がある。
- 心臓、肝臓または腎臓の病気がある。
- 以前に心臓のバイパス手術などを受けたことがある。
- 現在、妊娠中または授乳中である。
- 現在、他のお薬(市販薬を含む)を飲んでいる。



服用する際の注意点

- 包装シート(PTPシート)から取り出して、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- 痛みがひどいからといって、ご自分の判断で決められた量よりたくさん飲まないでください。副作用が起こりやすくなる場合があります。
- 服用中にめまいや傾眠などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う作業を行う場合には、十分注意してください。
- ご自分のお薬を、他の人には絶対にあげたりしないでください。

副作用について

主な副作用

- 傾眠(うとうとする)
- ^{ほっしん}発疹
- 下痢
- 腹痛
- 口内炎
- など

セレコキシブ錠「サワイ」を服用中に次のような症状があらわれた場合には、お薬を飲むのを中止して、すぐに主治医に相談してください。

- 胸が痛い(数分で消失する痛みでも、主治医に相談してください)
- しゃべりにくい
- 体の片側が^{まひ}麻痺する、手足が動かしにくい・しびれる
- 息切れ、息苦しい

他にも気になる点などがありましたら、医師・歯科医師・薬剤師に相談してください。