# メマンチン塩酸塩錠/OD錠/DS「サワイ」を
## 服用される患者さんとご家族・介護者の方へ

## このお薬について

- アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせるお薬です。
- 錠剤、口腔内崩壊錠(OD錠)、ドライシロップ(DS)のうち、いずれかを服用します。

### 錠/OD錠

**錠**

5mg

10mg

20mg

- 水と一緒に服用してください。

**OD錠**

5mg

10mg

20mg

- 口の中で溶けるため、水なしで服用できます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないようにしてください。
- 普通のお薬と同じように水で服用することもできます。どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

### ドライシロップ(DS)

5mg/包

10mg/包

20mg/包

- 服用時に水に混ぜて、速やかに服用してください。
- 粉末のままで、水と一緒に服用することもできます。


沢井製薬株式会社

GUMEMA01PV01

2020年8月Ⓚ10

## このお薬は、少量から服用を開始し、徐々に量を増やしていきます




- 1日1回5mgの服用から開始し、体をお薬に慣らすために、1週間に5mgずつ量を増やしていきます。4週目以降は、1日1回20mgを服用します。
- お薬の量を増やすのは、症状が悪化したからではありません。
- 医師の指示どおりに、決められた量の服用を続けましょう。
  ※変化がないように見えても、実際は症状の進行を遅らせていると考えられます。ご自分やご家族の判断で服用をやめたり、お薬の量を調節したりしないでください。
- 食事の時間にかかわらず服用できます。時間を決めて、毎日規則正しく服用しましょう。

## 服用時・保管時の注意について

- 飲みはじめに、**めまい**がしたり、**眠くなる**ことがありますので、転倒などに十分注意してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに1回分をできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分をとばしてください。**絶対に2回分を一度に飲まないでください。**
- 誤って多く服用してしまった場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- 飲む回数や量をまちがえないように、お薬はできるだけご家族や介護者の方が管理してください。
- アルツハイマー型認知症では、車の運転など危険を伴う機械の操作能力が低下することがあります。また、このお薬により、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、**車の運転など危険を伴う機械の操作はしないようにしてください。**
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。
- 服用中に気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。