


その他の注意点

このお薬を飲んだあと、便の中に錠剤の殻^{から}が出てくる可能性があります。

これは、お薬の成分が体内で吸収されたあとの残りです。
お薬の成分はきちんと吸収されていますので、ご安心ください。



医療機関名

ブソフェキ配合錠「サワイ」を服用される患者さんへ

このお薬は、アレルギー性鼻炎のくしゃみ・鼻水をおさえ、鼻づまりを改善します。

2つの有効成分を含む配合錠です

- ・フェキソフェナジン塩酸塩 (くしゃみ・鼻水をやわらげる)
- ・塩酸ブソイドエフェドリン (鼻を通りやすくする)

服用にあたっての注意点

次にあてはまる方は、服用の際に注意が必要です。
必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 糖尿病の方
- 高血圧の方
- 虚血性心疾患 (心筋梗塞・狭心症など) の方
- 眼圧の上昇のある方
- 甲状腺機能亢進症の方
- 前立腺肥大のある方
- 腎臓の病気のある方
- 他にお薬 (一般用医薬品やサプリメントを含む) を飲んでいる方

プソフェキ配合錠「サワイ」の飲み方

🕒 **1日2回、1回2錠ずつ、朝と夕の空腹時***に服用してください。

このお薬は、食事のあとに飲むと吸収が悪くなり、効き目が弱くなる可能性があります。

食後すぐの服用は避け、空腹時*に服用してください。

例：朝の起床時、夕食の前 など



*「空腹時」とは

お腹がすいている時、という意味ではありません。

食事の直後以外の、胃の中に食べ物が入っていない時のことです。

🕒 **このお薬は、かんだり砕いたりせず、水と一緒にそのまま服用してください。**

アレルギー性鼻炎の治療では、症状のタイプや重さに合わせたお薬を選んでもらうことが大切です。

まずはご自身の症状を医師にしっかりと伝えましょう。

また、治療中に症状が軽くなってきた場合は、医師に相談しましょう。

👉 **症状が改善したら...**

- ・医師と相談してお薬をやめることができます。
- ・他のお薬にきりかえたり、元のお薬に戻すことができます。

👉 **症状が改善しなかったら...**

- ・他のお薬にきりかえることがあります。
- ・他のお薬を追加することがあります。

プソフェキ配合錠「サワイ」の副作用

🕒 このお薬の主な副作用として、次のような症状があらわれることがあります。

・頭痛 ・^{ほっしん}発疹 ・疲労感 ・口が渇く

🕒 まれに、次のような副作用が起こることがあります。症状に気づいた場合は、お薬の服用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。

- ▶ ショック、アナフィラキシー
(じんましん、目や唇のまわりのはれ、息苦しさ、意識障害)
- ▶ けいれん
- ▶ 肝機能障害、黄疸
(全身のだるさ、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる)
- ▶ 無顆粒球症、白血球減少、好中球減少
(のどの痛み、頭痛、筋肉痛、寒気やふるえを伴って高熱が出る)
- ▶ 急性汎発性発疹性膿疱症
きゅうせいはんぱつせいほっしんせいのおほうしょう
(発熱、赤い斑点、赤くなった皮膚に小さな白いブツブツが出る)

気になる症状があらわれた場合は
医師または薬剤師に相談してください

