

バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」を 服用される患者さんへ

このお薬は、閉経後骨粗しょう症の治療薬です。

減少した女性ホルモン（エストロゲン）の替わりとなって、
過剰な骨吸収を抑え、骨代謝^{※1}のバランスを保ちます。骨の密度^{みつど}
を増やし、骨の質を改善することによって、骨折を防ぎます。

※1 骨代謝：骨吸収(骨をこわす)と骨形成(骨をつくる)を繰り返す、骨の新陳代謝のこと

骨粗しょう症患者さんの骨代謝のバランス



エストロゲン減少

閉経後骨粗しょう症では、
エストロゲンが減少したことにより、骨代謝のバ
ランスがくずれています。
骨量^{※2}が減少してもろく
なっているため、骨折しやす
くなります。



骨をこわす



骨をつくる

※2 骨量：骨に含まれるカルシウムなどの量

正常な骨代謝のバランス



バゼドキシフェン

エストロゲン減少

バゼドキシフェンは、バラ
ンスをくずしている骨代謝
を正常に近づけることで骨
を強くし、骨折を予防しま
す。

バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」は 1日1回1錠を服用してください。

1日のうちいつでも服用でき、食事の有無を気にする必要はありません。

次のような患者さんは、このお薬を服用することができません。
服用前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- ・じょうみゃくけっせんそくせんしやう 静脈血栓塞栓症である、または、かかったことがある
- ・長期間寝たきり、または、それに近い状態にある
- ・このお薬の成分に対して、過敏症がある
- ・妊婦、妊娠している可能性がある、授乳中である
- ・抗リン脂質抗体症候群の患者さん

※副作用について

起こりやすい症状

顔がほてる

手足がつる、足がけいれんする

乳房がはる

まれに、次のような副作用が起こる場合があります。症状に気づいた場合は、服用をやめてすみやかに医療機関を受診してください。

じょうみゃくけっせんそくせんしやう

静脈血栓塞栓症（静脈内に、血のかたまりができてつまる）

初期症状：足の痛み・むくみ、突然の息苦しさ、息切れ、
胸の痛み、急な視力低下

長時間にわたって、飛行機や車に乗るなど不動状態となる場合には、前もって医師または薬剤師にご相談ください。

その他にも気になる症状がありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

このお薬は、継続して服用することで効果が得られますので
必ず医師の指示どおりに飲み続けるようにしてください。