プレガバリンカプセル/OD錠「サワイ」を服用される患者さんへ

プレガバリン「サワイ」について

- このお薬は神経の痛みをやわらげます。
- 体をお薬に慣らすために、少しずつお薬の量を増やしていきます。
- 一定期間飲み続けることで効果を発揮します。痛いときにだけ服用するのではなく、決められた服用回数・量を守ってお飲みください。
- 効果があらわれるまでに時間がかかることもありますので、あせらず一歩ずつ治療に取り組みましょう。
- 痛みが軽減してきたら、医師と相談のうえ、お薬の量を減らしたりやめたりすることもできます。

お薬の量や服用方法等は、自分で判断せず、必ず医師の指示に従ってください。

OD錠は、だ液のみで口の中で溶けるため、水なしでも服用できます。ただし、苦みを感じる場合は、少量の水ですみやかに服用してください。

ウラ面もお読みください ▶

沢井製薬株式会社

服用するときの注意点

- めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。
  - ・特に高齢の方は、これらの症状により転倒し、骨折等を起こすおそれがありますので、十分に注意してください。
  - ・事故を起こすおそれがありますので、自動車等の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。
- 体重が増えることがあります。体重が増え始めた場合には、医師に相談してください。
- 視力の低下、目のかすみ、物が重なって見えるなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。
- 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- ほかにお薬（薬局で買ったお薬も含む）を服用している場合は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。
- アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。
- 誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 服用し忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く１回分を服用してください。決して２回分を一度に服用しないでください。
- 服用を急に中止すると、頭痛、下痢などがあらわれることがあります。
- 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々にお薬の量を減らしていきます。必ず医師と相談しながら進めてください。

気になる症状やわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

GUPREG01PV01

2020年12月ⓓ20