


プレガバリン「サワイ」の服用計画

プレガバリン「サワイ」は服用を開始したあと、1週間以上かけて少しずつお薬の量を増やしていきます。

患者さんの年齢や症状に合わせて医師がお薬の量を調整します。



服用期間	/ ~ /			/ ~ /			/ ~ /			/ ~ /		
1日服用量	() mg			() mg			() mg			() mg		
服用 タイミング (飲むお薬の個数を 記入しましょう)		25	75	150		25	75	150		25	75	150
		mg				mg				mg		
	朝				朝				朝			
	昼				昼				昼			
	夕				夕				夕			
	寝る前				寝る前				寝る前			
メモ (服用開始日などを 記入しましょう)												

ウラ面もお読みください

沢井製薬株式会社

プレガバリン「サワイ」について

体をお薬に慣らすために、少しずつお薬の量を増やしていきます。

一定期間飲み続けることで効果を発揮します。痛いときにだけ服用するのではなく、決められた服用回数・量を守ってお飲みください。

効果があらわれるまでに時間がかかることもありますので、あせらず一歩ずつ治療に取り組みましょう。

痛みが軽減してきたら、医師と相談のうえ、お薬の量を減らしたりやめたりすることもできます。

服用するときの注意点

○ めまいや眠気、意識消失があらわれることがあります。

- ・ 特に高齢の方は、これらの症状により転倒し、骨折等を起こすおそれがありますので、十分に注意してください。
- ・ 事故を起こすおそれがありますので、自動車等の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。

気になる症状やわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

○ 体重が増えることがあります。体重が増え始めた場合には、医師に相談してください。

○ 視力の低下、目のかすみ、物が重なって見えるなどの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合には、医師に相談してください。



○ 腎臓が悪い方、透析をうけている方、心臓が悪い方、妊娠中または授乳中の方は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○ ほかにお薬（薬局で買ったお薬も含む）を服用している場合は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。

○ アルコールはお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。

○ 誤って多く服用した場合は、医師または薬剤師に相談してください。

○ 服用し忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。

○ 服用を急に中止すると、不眠、吐き気、頭痛、下痢、不安、多汗症などがあらわれることがあります。

○ 服用をやめるときは、1週間以上かけて、徐々にお薬の量を減らしていきます。自分で判断せず、必ず医師と相談しながら進めてください。