

ジルムロ 配合錠 LD/HD 「サワイ」を 配合OD錠LD/HD 「サワイ」を 服用される患者さんへ

このお薬は、2つの有効成分で血圧を下げます。

このお薬に含まれる有効成分

● アジルサルタン

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬：アンジオテンシンⅡ（血管を収縮させて血圧を上昇させる物質）の働きをおさえて血圧を下げる

● アムロジピン

カルシウム拮抗薬：血管をひろげて血圧を下げる

お薬の名前と錠剤の色	ジルムロ 配合錠 LD「サワイ」	ジルムロ 配合OD錠 LD「サワイ」	ジルムロ 配合錠 HD「サワイ」	ジルムロ 配合OD錠 HD「サワイ」
	うすい赤色		うすい黄色	
有効成分				
アジルサルタン	20mg		20mg	
アムロジピン	2.5mg		5mg	

OD錠の飲み方

OD錠は口の中で溶けるため、水なしでも服用できます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないようにしてください。また、普通のお薬と同じように水で服用することもできますが、どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

〈服用する前の注意点〉

次にあてはまる方は、必ず、主治医または薬剤師にお伝えください。

- 以前にお薬を使用して、かゆみ、発疹ほっしんなどのアレルギー症状が出たことがある方
- 妊娠中または妊娠している可能性がある女性、または、授乳中の女性
- アリスキレンフマル酸塩を服用している糖尿病の方
- 他にお薬（薬局・薬店で買ったお薬を含む）やサプリメントを飲んでいる方

〈服用中の注意点〉

- 血圧が下がりすぎることにより、めまい、ふらつきがあらわれることがあります。高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械の操作には十分注意してください。
- 血圧を下げる作用が増強されることがありますので、グレープフルーツジュースと一緒に服用しないでください。

お薬を服用した後に体調がおかしいと感じたり、気になることがある場合には、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。