

副作用について

主な副作用として、次のような症状があらわれることがあります。症状が認められた場合には、主治医または薬剤師に相談しましょう。

- 口内乾燥（口がかわく）
- 便秘

次のような副作用にも注意しましょう。

- 排尿困難（尿が出にくい）、尿閉（尿が出なくなる）
症状があらわれた場合には、服用を中止し、主治医に相談してください。
- 目のかすみ、傾眠（うとうとする）、めまい など
高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う作業をする場合には、十分注意してください。

他にも気になる症状があらわれた場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

保管時の注意点


- 直射日光と湿気を避けて、室温で保管してください。
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。

ソリフェナシンコハク酸塩 錠 /OD錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

かかどうぼうこう
過活動膀胱における症状を改善するお薬です


● 排尿について ●

おしっこをためるとき



膀胱の筋肉がゆるみ、尿道が
とじることで尿がたまる

おしっこをだすとき



膀胱の筋肉が縮み、尿道が
ひらくことで尿が排泄される

過活動膀胱とは…



膀胱が過敏となっており、少量の尿がたまっただけでも膀胱が縮みやすくなっている状態で、以下のような症状があらわれます。

急におこる
おさえられない
強い尿意

トイレの回数が
多くなる

強い尿意を
がまんできず
尿がもれてしまう

服用する前の注意点

このお薬を飲む前に、下記の項目にひとつでもあてはまるものがありましたら、必ず主治医または薬剤師に伝えてください。

- ☐ 以前にお薬を飲んで発疹^{ほっしん}などが出たことがある。
- ☐ 尿が出にくいといった症状がある。
- ☐ 現在、閉塞隅角緑内障と診断され、治療中である。
- ☐ 胃腸の病気がある。
- ☐ その他の病気で治療中である。
- ☐ 現在、他のお薬（薬局・薬店で買ったお薬を含む）を飲んでいる。
- ☐ 高所作業、自動車の運転などをすることがある。
- ☐ 現在、妊娠中または授乳中である。

お薬の飲み方

- 1日1回服用します。毎日同じ時間に服用するようにしましょう。
- かみ砕かずに、そのまま飲んでください。
- 服用するときは、コップ1杯くらいの水またはぬるま湯といっしょに飲んでください。
- OD錠は口の中で溶けるため、水なしでも服用できます。ただし、寝たままの状態では水なしで服用しないようにしてください。普通のお薬と同じように水で服用することもできます。どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。
- 他のお薬（薬局・薬店で買ったお薬を含む）と一緒に服用すると、お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性があります。他に服用しているお薬がある場合は、主治医または薬剤師に相談してください。
- 服用し忘れた場合は、次の服用時間に1回分を服用してください。決して2回分を一度に服用しないでください。
- 誤って多く服用した場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

毎日続けて飲むことが大切です。自分の判断で飲むのをやめたりせず、必ず主治医または薬剤師の指示に従ってください。