

# タダラフィル錠20mgAD「サワイ」を 服用される患者さんへ

このお薬は、肺の血管をひろげて血流をよくすることにより、肺動脈性肺高血圧症の症状を改善します。

次にあてはまる方は、このお薬を服用することができません。  
服用前に必ず医師または薬剤師に相談してください。

- 以前にこのお薬の成分に対して過敏症（アレルギー）を起こしたことがある方
- 重い腎障害のある方
- 重い肝障害のある方
- 硝酸剤（狭心症などの心臓病のお薬）を使用している方
  - ・ ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジルなど
  - ・ 硝酸剤には、飲み薬、舌下薬、貼り薬、吸入薬、注射、塗り薬、スプレーといった様々な種類があります。あなたがお使いのお薬に硝酸剤が含まれていないか、服用前にあらかじめ医師または薬剤師に確認しましょう。
- 次のお薬を服用している方
  - ・ 肺高血圧症治療薬（リオシグアト）
  - ・ 抗HIV薬（リトナビル含有製剤、アタザナビル、インジナビル、ネルフィナビル、サキナビル、ダルナビル含有製剤、コビシスタット含有製剤）
  - ・ C型肝炎治療薬（テラプレビル、リトナビル含有製剤）
  - ・ 抗真菌薬（イトラコナゾール）
  - ・ 抗菌薬（クラリスロマイシン）
  - ・ 抗ウイルス薬（エンシトレルビル）
- 次のお薬を長期的に服用している方
  - ・ 抗菌薬（リファンピシン）
  - ・ 抗てんかん薬（フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール）

この他にもこのお薬と一緒に飲む時には注意すべきお薬があります。そのため、他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## お薬の飲み方

通常、1日1回40mg(2錠)を服用します。

ただし、腎臓や肝臓の機能が低下している方は、1日1回20mg(1錠)を服用します。

医師の指示通りに正しく服用しましょう。

## 副作用について

- 主な副作用として、次のような症状があらわれることがあります。症状が認められた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

頭痛、皮膚の赤み、筋肉痛、背中や腰の痛み、吐き気、消化不良

- 次のような症状があらわれた場合は、服用をやめて、すみやかに医師の診察を受けてください。

過敏症ほっしん (発疹、じんま疹、顔のむくみ)、剥脱性皮膚炎はくだつせいひふえん、皮膚粘膜眼症候群ひふねんまくがんしょうこうぐん

- 次の症状があらわれた場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

4時間以上続く勃起

- 次の症状があらわれた場合は、服用をやめて、すみやかに眼科専門医または耳鼻科専門医の診察を受けてください。

急激な視力低下や視力喪失、急激な聴力低下や突発性難聴

他にも気になる症状があらわれた場合は、  
医師または薬剤師に相談してください。

## その他の注意点

- めまいや視覚障害(目のかすみなど)があらわれる場合があります。高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときは、十分注意してください。
- グレープフルーツ(ジュースを含む)は、このお薬の作用を強めたり、副作用を起こしやすくするおそれがありますので、服用中は摂取を控えてください。