

ご家族の方へ

ご家族の方は、「死にたいという気持ちになる、興奮しやすい、攻撃的になる、ちょっとした刺激で気持ちの変調を来す」などの患者さんの行動の変化や、うつ症状などのもともとある病気の症状が悪化する危険性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、患者さんの状態の変化について観察してください。患者さんの状態に変化がみられた場合には、医師に連絡してください。また、患者さんご自身も、病状に変化があったと感じた場合には、ご家族の方にも伝えるようにしてください。

デュロキセチンカプセル「サワイ」

を服用される患者さんにご家族の方へ




飲みはじめる前の注意点

7～17歳のうつ病の患者さんがこのお薬を飲んだ場合、有効性が確認できなかったとの報告があります。18歳未満の患者さんやそのご家族の方は、医師と十分に相談してください。

デュロキセチンカプセル「サワイ」の飲み方

- 1日1回朝食後に服用します。
- 少量からはじめて、お薬の効果や副作用の状態をみながら、徐々に飲む量を増やしていきます。



- 体調がよくなったとご自身で判断して服用を中止したり、量を減らしたりすると、「些細なことでも心配になる、いらいらする、あせる」などの症状があらわれることがあります。

医師の指示通りに服用を続けましょう。

医療機関名

沢井製薬株式会社

服用中の注意点

- 1 このお薬は、効果があらわれるまでに時間がかかる場合があります。**すぐに効かないからとご自身の判断で服用を中止したり、量を変えたりしないように注意**してください。
- 2 うつ病やうつ状態の人は症状として死んでしまいたいと感じることがあります。このお薬を飲んでいいる間(特に飲みはじめや、飲む量を変えたとき)に、不安感が強くなり死にたいと思うなど症状が悪くなる場合があります。このような症状があらわれた場合は、医師に相談してください。
- 3 次のような攻撃的な態度や行動をとることがあります。

- 不安になる
- いらいらする
- あせる
- 興奮しやすい
- 発作的にパニック状態になる
- ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す
- 敵意を持つ
- 攻撃的になる
- 衝動的に行動する
- じっとしていることができない など

これらの症状があらわれた場合は、医師に相談してください。このお薬との関連性は明らかではありませんが、これらの症状があらわれた人の中には、うつ症状などのもともある病気の症状が悪化する場合や、死んでしまいたいと感じたり、他人に対して危害を加えたりする場合があります。

- 4 飲みはじめの時期に、**吐き気やめまい**などの副作用があらわれることがあります。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。ご自身の判断で服用を中止しないでください。
- 5 **めまいやふらつき**により転倒することがあります。このような症状を感じた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- 6 眠気、めまいなどを起こすことがありますので、**自動車の運転などをする際は、十分に注意**してください。これらの症状を自覚した場合は、自動車の運転などは絶対にしないでください。特にお薬の飲みはじめ、飲む量を変えたとき、他のお薬から変えたときにこれらの症状があらわれやすいため、医師から運転などをしないよう指示があった場合は必ず守ってください。
- 7 飲酒によりお薬の作用や副作用が強まる場合がありますので、注意してください。
- 8 このお薬には一緒に飲んではいけないお薬や一緒に飲む時には注意すべきお薬があります。そのため、**他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談**してください。
- 9 カプセルを開けたりせず、**そのまま服用**してください。

**気になること、わからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。**