



# 主な抗インフルエンザウイルス薬の投与量一覧



## 体重で投与量が異なる薬剤

予防目的の投与は保険給付対象外です。

製品名	剤形	含量 (有効成分)	効能・効果	小児の1回用量：体重別（有効成分として）											成人の1回用量 (有効成分として)	投与回数・投与期間		投与に関する注意点
				3kg	8kg	10kg	15kg	20kg	25kg	30kg	35kg	37.5kg	40kg	小児		成人		
タミフル®カプセル75	カプセル	75mg/カプセル	治療											75mg	75mg	1日2回 × 5日間		小児への投与は体重37.5kg以上
			予防												75mg	75mg	1日1回 × 10日間	1日1回 × 7~10日間
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	カプセル	75mg/カプセル	治療											75mg	75mg	1日2回 × 5日間		小児への投与は体重37.5kg以上
			予防												75mg	75mg	1日1回 × 10日間	1日1回 × 7~10日間
タミフル®ドライシロップ3%	ドライシロップ	30mg/g	治療	新生児、乳児の場合 3mg/kg	20mg	30mg	40mg	50mg	60mg	70mg			75mg	75mg	1日2回 × 5日間		新生児、乳児の場合：3mg/kg 幼児の場合：2mg/kg	
			予防		20mg	30mg	40mg	50mg	60mg	70mg			75mg	75mg	1日1回 × 10日間	1日1回 × 7~10日間	幼児の場合：2mg/kg	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	ドライシロップ	30mg/g	治療	新生児、乳児の場合 3mg/kg	20mg	30mg	40mg	50mg	60mg	70mg			75mg	75mg	1日2回 × 5日間		新生児、乳児の場合：3mg/kg 幼児の場合：2mg/kg	
			予防		20mg	30mg	40mg	50mg	60mg	70mg			75mg	75mg	1日1回 × 10日間	1日1回 × 7~10日間	幼児の場合：2mg/kg	
ゾフルーザ®錠10mg/20mg	錠	10mg/錠 20mg/錠	治療			10mg（12歳未満）		20mg（12歳未満）				40mg**	40mg (体重80kg以上：80mg)	1日1回 × 1日間		12歳未満 10kg以上 20kg未満：10mg 20kg以上 40kg未満：20mg 40kg以上：40mg		
			予防 (錠20mgのみ)										20mg（12歳未満）	40mg** (体重80kg以上：80mg)	1日1回 × 1日間		12歳未満 20kg以上 40kg未満：20mg 40kg以上：40mg	
ゾフルーザ®顆粒2%分包 <sup>†</sup> <sup>†</sup> 薬価基準未収載	顆粒	10mg/包	治療										20mg（12歳未満）	40mg** (体重80kg以上：80mg)	1日1回 × 1日間		12歳未満 10kg以上 20kg未満：10mg 20kg以上 40kg未満：20mg 40kg以上：40mg	
			予防										20mg（12歳未満）	40mg** (体重80kg以上：80mg)	1日1回 × 1日間		12歳未満 20kg以上 40kg未満：20mg 40kg以上：40mg	
点滴 ラピアクタ®点滴静注液 バッグ300mg/バイアル150mg	注射剤	300mg/袋 150mg/バイアル	治療			100mg	150mg	200mg	250mg	300mg	350mg	375mg	400mg	300mg (重症化するおそれのある患者：600mg)	1日1回 × 1日間 [症状に応じて連日反復投与可能]		小児の場合：10mg/kg ・15分以上かける ・上限は600mg	

\*12歳以上かつ80kg以上：80mg

## 年齢で投与量が異なる薬剤

予防目的の投与は保険給付対象外です。

製品名	剤形	含量 (有効成分)	効能・効果	小児の1回用量：年齢別（有効成分として）														成人の1回用量 (有効成分として)	投与回数・投与期間	
				0歳	1歳	2歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳		小児	成人
リレンザ®	粉末（吸入剤）	5mg/プリスター	治療														10mg（2プリスター）*	10mg (2プリスター)	1日2回 × 5日間	
			予防															10mg（2プリスター）*	10mg (2プリスター)	1日1回 × 10日間
イナビル®吸入粉末剤20mg	粉末（吸入剤）	20mg/容器	治療													20mg*	40mg*	40mg	1日1回 × 1日間	
			予防														20mg*	40mg または 20mg*	40mg または 20mg	10歳未満（20mg） 1日1回 × 1日間
イナビル®吸入懸濁用160mgセット	粉末（吸入剤）	160mg/バイアル	治療													160mg	160mg	1日1回 × 1日間		

\*適切に吸入投与できると判断された場合にのみ

# 主な抗インフルエンザウイルス薬の効能・効果、用法・用量 一覧

医療関係者用

製品名	効能・効果	用法・用量															
オセルタミビル	タミフル®カプセル75	<p><b>治療</b> 通常、成人及び体重37.5kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間経口投与する。</p> <p><b>予防</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7～10日間経口投与する。</p> <p>●体重37.5kg以上の小児 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、10日間経口投与する。</p>															
	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	<p><b>治療</b> 通常、成人及び体重37.5kg以上の小児にはオセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間経口投与する。</p> <p><b>予防</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7～10日間経口投与する。</p> <p>●体重37.5kg以上の小児 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、10日間経口投与する。</p>															
	タミフル®ドライシロップ3%	<p><b>治療</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>●小児 通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。  <b>幼小児の場合</b>：2mg/kg（ドライシロップ剤として66.7mg/kg）  <b>新生児、乳児の場合</b>：3mg/kg（ドライシロップ剤として100mg/kg）</p> <p><b>予防</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7～10日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>●小児 通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日1回、10日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。  <b>幼小児の場合</b>：2mg/kg（ドライシロップ剤として66.7mg/kg）</p>															
	オセルタミビルDS3%「サワイ」	<p><b>治療</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>●小児 通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日2回、5日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。  <b>幼小児の場合</b>：2mg/kg（ドライシロップ剤として66.7mg/kg）  <b>新生児、乳児の場合</b>：3mg/kg（ドライシロップ剤として100mg/kg）</p> <p><b>予防</b> ●成人 通常、オセルタミビルとして1回75mgを1日1回、7～10日間、用時懸濁して経口投与する。</p> <p>●小児 通常、オセルタミビルとして以下の1回用量を1日1回、10日間、用時懸濁して経口投与する。ただし、1回最高用量はオセルタミビルとして75mgとする。  <b>幼小児の場合</b>：2mg/kg（ドライシロップ剤として66.7mg/kg）</p>															
パロキサビル マルボキシル	ゾフルーザ®錠20mg ゾフルーザ®顆粒2%分包装 十薬基準未収載	<p>通常、以下の用量を単回経口投与する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>年齢</th> <th>体重</th> <th>用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">治療</td> <td rowspan="2">成人及び12歳以上の小児</td> <td>80kg以上</td> <td>20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）</td> </tr> <tr> <td>80kg未満</td> <td>20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12歳未満の小児</td> <td>40kg以上</td> <td>20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）</td> </tr> <tr> <td>20kg以上40kg未満 10kg以上20kg未満</td> <td>20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 10mg錠 1錠（パロキサビル マルボキシルとして10mg）</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	年齢	体重	用量	治療	成人及び12歳以上の小児	80kg以上	20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）	80kg未満	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）	12歳未満の小児	40kg以上	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）	20kg以上40kg未満 10kg以上20kg未満	20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 10mg錠 1錠（パロキサビル マルボキシルとして10mg）
	効能・効果	年齢	体重	用量													
治療	成人及び12歳以上の小児	80kg以上	20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）														
		80kg未満	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）														
	12歳未満の小児	40kg以上	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）														
		20kg以上40kg未満 10kg以上20kg未満	20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 10mg錠 1錠（パロキサビル マルボキシルとして10mg）														
ゾフルーザ®錠10mg	<p>通常、以下の用量を単回経口投与する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th>年齢</th> <th>体重</th> <th>用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">予防</td> <td rowspan="2">成人及び12歳以上の小児</td> <td>80kg以上</td> <td>20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）</td> </tr> <tr> <td>80kg未満</td> <td>20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">12歳未満の小児</td> <td>40kg以上</td> <td>20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）</td> </tr> <tr> <td>20kg以上40kg未満 40kg未満</td> <td>20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg）</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	年齢	体重	用量	予防	成人及び12歳以上の小児	80kg以上	20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）	80kg未満	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）	12歳未満の小児	40kg以上	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）	20kg以上40kg未満 40kg未満	20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg）	
効能・効果	年齢	体重	用量														
予防	成人及び12歳以上の小児	80kg以上	20mg錠 4錠 又は 顆粒 8包（パロキサビル マルボキシルとして80mg）														
		80kg未満	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）														
12歳未満の小児	40kg以上	20mg錠 2錠 又は 顆粒 4包（パロキサビル マルボキシルとして40mg）															
	20kg以上40kg未満 40kg未満	20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg） 20mg錠 1錠 又は 顆粒 2包（パロキサビル マルボキシルとして20mg）															
ラミアクタ®点滴静注液 バッグ300mg ラミアクタ®点滴静注液 バイアル150mg	A型又はB型インフルエンザウイルス感染症	<p>●成人 通常、ペラミビルとして300mgを15分以上かけて単回点滴静注する。合併症等により重症化するおそれのある患者には、1日1回600mgを15分以上かけて単回点滴静注するが、症状に応じて連日反復投与できる。なお、年齢、症状に応じて適宜減量する。</p> <p>●小児 通常、ペラミビルとして1日1回10mg/kgを15分以上かけて単回点滴静注するが、症状に応じて連日反復投与できる。投与量の上限は、1回量として600mgまでとする。</p>															
ザナミビル	リレンザ®	<p><b>治療</b> 通常、成人及び小児には、ザナミビルとして1回10mg（5mgプリスターを2プリスター）を、1日2回、5日間、専用の吸入器を用いて吸入する。</p> <p><b>予防</b> 通常、成人及び小児には、ザナミビルとして1回10mg（5mgプリスターを2プリスター）を、1日1回、10日間、専用の吸入器を用いて吸入する。</p>															
ラニナビル	イナビル®吸入粉末剤20mg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th colspan="2">用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">治療</td> <td>成人</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小児</td> <td>10歳以上</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。</td> </tr> <tr> <td>10歳未満</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。</td> </tr> </tbody> </table>	効能・効果	用法・用量		治療	成人	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。	小児	10歳以上	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。	10歳未満	ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。				
	効能・効果	用法・用量															
治療	成人	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。															
	小児	10歳以上	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。														
		10歳未満	ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。														
イナビル®吸入懸濁用160mgセット	<table border="1"> <thead> <tr> <th>効能・効果</th> <th colspan="2">用法・用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">予防</td> <td>成人</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。また、20mgを1日1回、2日間吸入投与することもできる。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小児</td> <td>10歳以上</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。</td> </tr> <tr> <td>10歳未満</td> <td>ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>成人及び小児には、ラニナミビルオクタン酸エステルとして160mgを日本薬局方生理食塩液2mLで懸濁し、ネプライザを用いて単回吸入投与する。</p>	効能・効果	用法・用量		予防	成人	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。また、20mgを1日1回、2日間吸入投与することもできる。	小児	10歳以上	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。	10歳未満	ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。					
効能・効果	用法・用量																
予防	成人	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。また、20mgを1日1回、2日間吸入投与することもできる。															
	小児	10歳以上	ラニナミビルオクタン酸エステルとして40mgを単回吸入投与する。														
		10歳未満	ラニナミビルオクタン酸エステルとして20mgを単回吸入投与する。														