

オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」 をご使用の患者さんへ

アレルギー性結膜炎による、くり返す目のかゆみや
結膜充血などの症状を抑える目薬です。

点眼方法

- 点眼前にはよく手を洗ってください。
- 点眼時に容器の先が目やまつ毛、まぶたに触れないように注意してください。
- 目からあふれた目薬は、ティッシュなどですぐにふき取ってください。
- 点眼後は目を閉じて、1～5分程度目頭を軽く押さえてください。



使用上の注意

点眼時

- コンタクトレンズをしている方は、コンタクトレンズをはずしてから点眼してください。また点眼後は10分以上経過してからコンタクトレンズを装用してください。
- 他の目薬も使用している場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼してください。
- 医師に指示された用法・点眼方法を必ず守ってください。

開封後

- 光に当たらないように添付の遮光袋に入れて保存してください。
- 開封後は4週間以内に使用し、残液は使用しないでください。

その他

- 目が痛い、目やまぶたが赤くなる、目やまぶたの周りが腫れる、目やまぶたがかゆい、頭痛がするなどの症状があらわれた場合は、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。
- その他、点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。