

# レベチラセタム「サワイ」を 服用される患者さんにご家族の方へ

レベチラセタム「サワイ」はてんかんの治療薬です。脳内の神経細胞における過剰な興奮をおさえることで、てんかん発作をおこしにくくします。

このお薬は、医師の指示通りに飲み続けることが大切です。体調が良くなったとご自分の判断で服用を中止したり、量を調整したりしないようにしましょう。

## 服用する前の注意点

**!** 次のような方は、このお薬を服用できません。

- 以前にこのお薬に含まれる成分やピロリドン誘導体(ピラセタム：ミオクローヌス治療薬)を使用して、アレルギー症状があらわれたことがある方

**!** 次にあてはまる方は、服用する前に必ず医師または薬剤師に伝えてください。

- 以前にお薬を使用して、かゆみや発疹などのアレルギー症状があらわれたことがある方
- 腎臓に障害のある方
- 肝臓に重い障害のある方
- 妊娠中または妊娠の可能性がある方、授乳中の方
- 他にお薬などを使用している方(薬局・薬店で買ったお薬を含む)

〈レベチラセタム DS50%「サワイ」を服用される場合〉

- フェニルケトン尿症の方

## 服用中の注意点

- ご自分の判断で服用する量を減らしたり、服用を中止したりしないでください。てんかん発作が悪化したり、てんかん重積状態\*があらわれることがあります。服用を中止する場合には、医師の指導のもと少なくとも2週間以上かけて徐々に減量します。医師の指示通り正しく服用しましょう。 \* てんかん発作が長引いたり、発作をくりかえす状態
- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- このお薬の服用で、「ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す、意識が乱れる、考えがまとまらない、いらいらする、あせる、興奮しやすい、攻撃的になる」などの精神症状があらわれ、死にたいという気持ちになる可能性があります。患者さんやご家族などの方は、このことについて医師から十分に理解できるまで説明を受けてください。

### 患者さんへ

攻撃的になる、死にたいという気持ちになるなどの精神症状があらわれた場合には、医師に相談し、ご家族などの方にも伝えてください。

### ご家族などの方へ

患者さんの状態の変化について観察し、変化が見られた場合には医師に連絡してください。

- 妊娠中または妊娠の可能性がある方は、医師に相談してください。
- 授乳中の方は授乳を避けてください。
- 他の医師を受診する場合や、薬局・薬店で他のお薬を購入する場合は、このお薬を服用していることを、必ず医師または薬剤師に伝えてください。

このほかにも気になることやわからないことがある場合は  
医師または薬剤師に相談してください。