

イブラチモド錠25mg「サワイ」 を服用される患者さんへ

このお薬は、関節リウマチの治療薬です。
炎症の原因となる物質がつくられるのをおさえることで、
関節の腫れや痛みなどの症状を改善します。




服用する前の注意点

！ ワルファリン*を服用中の方は、**このお薬を服用できません。**

* 血液を固まりにくくし、血栓を防ぐお薬

ワルファリンを服用している場合は、ご自身の判断で服用を中止したり
せずに、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

他の医療機関を受診するときは、
『イブラチモド錠 25mg「サワイ」服用カード』を
医師または薬剤師に見せてください。




(縮小イメージ)

！ 次にあてはまる方は、**服用前に必ず医師または薬剤師に伝えてください。**

- これまでに、お薬や食物により**アレルギー**の症状があらわれたことがある
- 肝臓や腎臓の病気**がある、あるいは過去にあった
- 消化性潰瘍**（胃潰瘍、十二指腸潰瘍など）と診断されたことがある
- 現在、**胃腸症状**（腹痛、便が黒くなる、吐き気、胸やけなど）がある
- 体重が **40kg 未満**である
- 貧血**や**血液の異常**を指摘されたことがある
- 現在、**他のお薬**（薬局・薬店で買ったお薬を含む）を飲んでいる
- 妊娠中**または**妊娠の可能性**がある、**授乳中**である

お薬の飲み方

通常、**1日1回(朝食後に1錠)**から服用を始めます。**4週間以上服用した後**、医師の指示に従って、**1日2回(朝・夕食後に1錠ずつ)**へ増やします。少ない量から始めることで、副作用がおこりにくくなることがわかっています。



服用中の注意点

- 服用し忘れた場合は、次の服用時間に1回分(1錠)を服用してください。決して2回分(2錠)を一度に服用しないでください。
- お薬の効果があらわれるまでに数カ月かかる場合があります。すぐに効かないからとご自身の判断でお薬の量や回数を変更したり、服用を中止したりしないでください。
- 医師の指示に従って、定期的に血液検査や尿検査を、場合によっては胸部X線検査や胸部CT検査を受けてください。副作用を早期に発見し、適切な処置を行うことができます。
- 次のような症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
 - ・発熱、のどの痛み、鼻血や歯ぐきの出血、動悸、めまいなど
はんけつきゅうげんしょうじょう むかりゅうきゅうじょう
(汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少)
 - ・全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなるなど(肝機能障害)
 - ・腹痛、便が黒くなる、吐き気、胸やけなど(消化性潰瘍)
 - ・発熱、から咳、息苦しさなど(かんしつせいはいえん間質性肺炎)
 - ・かぜのような症状、全身のだるさ、発熱、嘔吐など(感染症)
 - ・発疹、かゆみなど(過敏症) など

このほかにも気になる症状やわからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。