

がん化学療法に伴い

フェブキシソスタット錠/OD錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

— 医師または薬剤師のみなさまへ —

本指導箋は、「がん化学療法に伴う高尿酸血症」の予防を
目的にフェブキシソスタット錠/OD錠「サワイ」を処方
された患者さんにお渡してください。

用法及び用量

〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉

通常、成人にはフェブキシソスタットとして60mgを1日1回経口投与する。

用法及び用量に関連する注意

〈がん化学療法に伴う高尿酸血症〉

- ・ 本剤は、がん化学療法開始1～2日前から投与を開始すること。
- ・ 臨床症状及び血中尿酸値をモニタリングしながら、化学療法開始5日目まで投与すること。なお、患者の状態に応じて、投与期間を適宜延長すること。

服薬指導にあたっては、最新の電子化された添付文書をご確認ください。

沢井製薬株式会社



(01)14987080276118

専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることで、
電子化された添付文書を閲覧できます。

がん化学療法に伴い

フェブキソスタット錠/OD錠「サワイ」を 服用される患者さんへ

体の中で尿酸をつくる酵素の働きをおさえ、尿酸がつかられないようにするお薬です。


がん化学療法に伴い血液中の尿酸の量が増えるのを防ぎます。

このお薬は、がん化学療法を開始する1～2日前から飲み始めます

がん化学療法による高尿酸血症を防ぐために、がん化学療法を開始する1～2日前から開始5日目まで、60mgを1日1回服用します。

お薬を服用する期間は、尿酸値の状況や患者さんの体の状態によって、変更されることもあります。

医師の指示どおりに正しく服用しましょう。



OD錠の飲み方

OD錠は口の中で溶けるため、水なしでも服用できます。ただし、寝たままの状態では水なしで服用しないようにしてください。

普通のお薬と同じように水で服用することもできます。どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。

ウラ面もお読みください

次にあてはまる方は

服用前に必ず医師または薬剤師に相談してください

- これまでに、お薬を使用して発疹やかゆみなどのアレルギー症状があらわれたことがある
- メルカプトプリン水和物またはアザチオプリンを服用している
- 現在、他に使用しているお薬(薬局・薬店で買ったお薬を含む)などがある
- 肝臓や腎臓の病気がある
- 妊娠中または妊娠の可能性がある、授乳中である

服用中は次のようなことに気をつけてください

飲み忘れた場合…

化学療法開始前 医師に相談し、指示に従ってください。

化学療法開始後 気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分とばしてください。決して2回分を一度に飲まないでください。

次のような症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- ・ 関節の痛み
- ・ 手足の不快感
- ・ 手足の痛み
- ・ 下痢
- ・ 倦怠感(だるさ)
- ・ 関節の違和感やむずむず感(痛風発作の初期症状) など

まれに、次のような症状があらわれる可能性があります。症状に気づいた場合は、服用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。

- ・ 全身のだるさ、食欲低下、皮膚や白目が黄色くなるなど
- ・ 全身の皮疹や発疹など

このほかにも気になる症状やわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。



sawai

