

軟カプセル剤の夏季における取り扱いのお願い

下記製品は、添加剤としてゼラチン含有している「軟カプセル剤」です。

ゼラチンの特性から、高温多湿条件下での保管により、カプセルが吸湿により軟化し、付着やベタつきが生じる可能性があります。

梅雨や夏場など湿度が高い時期の保管環境には、ご配慮頂きますようお願い申し上げます。¹⁾

軟カプセル剤 製品一覧

- ・ アルファカルシドールカプセル0.25 μ g/0.5 μ g/1 μ g「サワイ」
- ・ イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」
- ・ イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg/600mg/900mg「サワイ」
- ・ エルデカルシトールカプセル0.5 μ g/0.75 μ g「サワイ」
- ・ カルシトリオールカプセル0.25 μ g/0.5 μ g「サワイ」
- ・ デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」
- ・ デュタステリドカプセル0.5mgZA「サワイ」
- ・ トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
- ・ ニフェジピンカプセル5mg/10mg「サワイ」

1) 参考文献: 橋爪 圭吾, PHARM TECH JAPAN, じほう, Vol.26 No.13, 2010, p117-120

◆ 医療関係者様へのお願い

- 夏季(梅雨・夏場)は湿度が高いため、**可能であれば軟カプセル剤は一次包装(PTPシート、アルミ分包)のままでの調剤をお願いします。**
- **自動分包機ケース内**に軟カプセル剤が保管されている場合には、夜間の湿度にもご注意ください。
- **製品の使用にあたりましては、各製品の電子添文をご確認下さい。**

◆ 医療関係者から患者さんへお伝えいただきたいこと(梅雨・夏場)

- 軟カプセル剤は缶などの**密閉容器に、乾燥剤(シリカゲルなど)を入れて、光の当たらない涼しい場所に保管**して下さい。
- 夏場の車内は高温になりますので、お薬を**車内に放置しない**ようお願いします。
- **PTPシートはハサミなどで切り離さず、そのまま保管**して下さい。(切り離れたシートの角は鋭利なので別のシートに穴を開けて湿気が入る場合があります。)

<お問い合わせ先>

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター

フリーダイヤル 0120-381-999