



再発性の単純疱疹 (口唇ヘルペス・性器ヘルペス) に対する治療を 受けられる方へ

注意事項

- 次のような再発の初期症状があらわれた場合、症状発現後すみやかに(6時間以内)お薬を服用してください。
 - 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
※ただし、性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
 - むずむずするような違和感
 - かゆみ
 - 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)
これらは、単純疱疹の再発時に一般的にみられる症状です。

- 医師の指示どおりに、お薬を服用してください。

□2回服用するよう指示された場合

2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用してください。12時間後が就寝中となる場合は、6~18時間後の範囲で、就寝前または起床後に服用してください。

□1回のみ服用するよう指示された場合

1回のみ服用し、決して2回目の服用はしないでください。

- 妊娠中または妊娠している可能性がある方、授乳中の方は、お薬を服用せずに処方された医師に相談してください。

- 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- 再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

お薬の保管に関する注意

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避けて室温(1~30℃)で保管してください。光により変色することがあります。変色したお薬は、服用しないでください。
- お薬は湿気を避けるためにアルミ袋に入れて保管してください。
- 使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。