

ヒドロキシクロロキン 硫酸塩錠200mg「サワイ」服薬指導のお願い

■ 用法及び用量

本剤の1日の投与量は、ブローカ式桂変法により求められる右記の理想体重に基づき決定されます。

女性患者さんの場合

$$\text{理想体重 (kg)} = (\text{身長 (cm)} - 100) \times 0.85$$

身長	136cm以上154cm未満	154cm以上173cm未満	173cm以上
理想体重	31kg以上46kg未満	46kg以上62kg未満	62kg以上
1回投与量	1錠 (200mg)	1錠 (200mg) と 2錠 (400mg) を 1日おき	2錠 (400mg)

男性患者さんの場合


$$\text{理想体重 (kg)} = (\text{身長 (cm)} - 100) \times 0.9$$

身長	134cm以上151cm未満	151cm以上169cm未満	169cm以上
理想体重	31kg以上46kg未満	46kg以上62kg未満	62kg以上
1回投与量	1錠 (200mg)	1錠 (200mg) と 2錠 (400mg) を 1日おき	2錠 (400mg)

■ 飲み忘れ時の対応について患者さんに指導してください。

服用し忘れた場合は、決して**2回分を一度に服用しない**でください。
1錠と2錠を交互に服用している患者さんが**次に服用する際は、服用し忘れた日の分**を服用してください。

■ 製品箱に同梱している患者さん向けの服薬指導箋を患者さんに渡してください。




■ 1錠と2錠を交互に服用する患者さんへの服薬指導

- 1日目：1錠、2日目：2錠、3日目：1錠と、1日おきに服用する量が変わります。
- 本剤のPTPシートをPTPホルダーにセットして、患者さんに渡してください。
- 患者さんには、PTPホルダーを活用して、服用方法を間違えないよう指導してください。

PTPホルダーの使い方

- PTPホルダーの中面に、PTPシートをセットします。
 - 1列のPTPシートをうら面が見えるように置き、切込みに挟んで固定します。
 - 2列のPTPシートを同様に固定します。
- PTPホルダーのおもて面とうら面をとめます。
 - PTPホルダーを二つ折りにして、3ヶ所の「ツメ」をしっかり押し込みます。



該当しない服用方法のイラストには**×**をつけてください。

【例】 1日1回
1錠



1日1回
2錠



1日1回
1錠と2錠を交互に

