


# サキサグリプチン錠2.5mg/5mg「サワイ」を服用されている方へ

## ■サキサグリプチン錠2.5mg「サワイ」 ■サキサグリプチン錠5mg「サワイ」



## サキサグリプチン錠「サワイ」は、2型糖尿病のお薬です。

このお薬は、インスリン分泌を促すホルモンであるインクレチンを分解する酵素 (DPP-4) を阻害し、血糖値を下げる働きがあります。



通常、1日1回5mgを服用します。  
状態により、1日1回2.5mgを服用します。

### ⚠ 服用時の注意

- 医師または薬剤師の指示どおりの用量を服用してください。自己判断により服用を中止したり、服用する量を変更したりしないでください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いたときに1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、飲まずに次の服用時間に1回分飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- 誤って多く飲んだ場合は、副作用の症状があらわれるおそれがありますので、医師または薬剤師にご相談ください。
- 低血糖をおこすことがありますので、十分ご注意ください。(裏面参照)
- 低血糖症状、めまい等があらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際はご注意ください。
- 小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。

## 副作用について

次のような症状があらわれた場合は、担当の医師または薬剤師にご相談ください。



ほかにも気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

### 〈低血糖の症状〉

軽い

強い空腹感、倦怠感、吐き気、手足のふるえ、脱力感、顔が青白い、冷や汗、動悸 など

頭痛、眠気、強い疲労感、見にくい、集中できない、めまい、動作がぎこちない など

重い

意識消失、けいれん、こん睡状態

※低血糖の症状には個人差があります。

### 〈低血糖の症状があらわれたら〉

まずは糖分(砂糖、ブドウ糖、糖分を多く含む飲み物など)を補給しましょう。  
α-グルコシダーゼ阻害薬と一緒に服用している方は、ブドウ糖を摂取してください。

それでも症状がおさまらない場合は、すぐに医療機関へ連絡してください。