

# ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」

## を服用されている方へ



**ビルダグリプチン錠「サワイ」は、2型糖尿病のお薬です。**

インクレチンという血糖値を調節するホルモンの分解を防ぐことで、血糖値を下げる働きがあります。

### 飲み方

1回1錠(50mg)を

1日2回(朝と夕)または1日1回(朝)

医師または薬剤師の指示どおりの用法及び用量で服用してください。自己判断により服用を中止したり、服用する量を変更したりしないでください。

### 服用時の注意

- 飲み忘れた場合は、気が付いたときに1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、飲まずに次の服用時間に1回分飲んでください。**絶対に2回分を一度に飲んではいけません。**
- 高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際はご注意ください。

### 副作用について

- 低血糖をおこすことがありますので、十分ご注意ください。(裏面参照)
- 「空腹感」、「便秘」、「脱力感」などの症状があらわれることがあります。
- 「持続的な激しい腹痛」、「嘔吐」などの症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合は、服用をやめ、すぐに医師の診察を受けてください。
- ほかに気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この説明書の内容は、ご家族やまわりの方にもお知らせください。

裏面もご覧ください▶


# 低血糖について

血糖値の低くなりすぎた状態が「低血糖」です。低血糖は、進行すると意識を失うこともあるため、気づいたら早めに対策をとる必要があります。

## ■ 低血糖をおこしやすい時 ■

- 食事の時間が遅れた、量が少なかった
- お酒を飲みすぎた
- 運動量が多すぎた
- お菓子の量が不適切だった など

## ■ 低血糖の症状 ■



※ 低血糖の症状には個人差があります。

## ■ 低血糖の症状があらわれたら ■

- 早めに気づいて対処することで、重い低血糖症状を避けることができます。
- **まずは糖分（砂糖、ブドウ糖、糖分を多く含む飲み物など）を補給しましょう。**  $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬と一緒に服用している方は、ブドウ糖を摂取してください。それでも症状がおさまらない場合は、すぐに医療機関へ連絡してください。