









リバーロキサバン錠/OD錠「サワイ」 を服用されている方へ

裏面の注意事項も必ずお読みください。

このお薬は、血を固まりにくくする効果が期待されます。

☼ リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	☼ リバーロキサバン錠15mg「サワイ」
 	 

☼ リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」	☼ リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」
 	 

医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。

リバーロキサバン錠/OD錠「サワイ」を服用される際は、 以下の点にご注意ください

- 歯の治療、内視鏡検査や手術を受ける場合は、リバーロキサバン錠/OD錠「サワイ」を服用中であることを、**必ず事前に**医師または薬剤師にお伝えください。
- **他の医療機関で治療を受ける場合や、市販薬を購入する場合は**、リバーロキサバン錠/OD錠「サワイ」を服用中であることを必ず医師または薬剤師にお伝えください。
- 飲み忘れると、血栓塞栓症が起こるリスクが高くなります。医師または薬剤師の指示どおりに服用してください。
また、ご自身の判断で服用をやめたり、飲む回数を減らしたりしないでください。
- 服用中は血が固まりにくくなるため、出血しやすくなります。
以下に当てはまる場合は、すぐに医師に連絡してください。
 - ・ 血便、血尿が出る
 - ・ 腫れあがるような皮下出血(あおあざ)がある
 - ・ 圧迫などの止血対策を行っても、血が止まらない、鼻血や歯ぐきからの出血が続く
 - ・ その他、出血が気になる
- これまで服用していた他の抗凝固薬が残っている場合は、必ず医師または薬剤師にお伝えください。**決してリバーロキサバン錠/OD錠「サワイ」と残っている抗凝固薬を合わせて服用しないでください。**

OD錠の飲み方

OD錠は口の中で溶けるため、水なしでも服用できます。ただし、寝たままの状態では、水なしで服用しないようにしてください。また、普通のお薬と同じように水で服用することもできますが、どちらの飲み方でも、効きめは変わりません。