

●次の症状があらわれた場合は、服用をやめて、すぐに医師に相談してください。

尿意があるのに
尿が出にくい

顔や唇がむくむ、
のどが腫れる



立ちくらみや
どつき
動悸がする



この他にも気になる症状があらわれた場合は、
すぐに医師または薬剤師に相談しましょう。

医療機関名

沢井製薬株式会社

2026年6月©20

フェソテロジンフマル酸塩徐放錠「サワイ」 を服用されている方へ

●このお薬は、過活動膀胱 (OAB) の症状を改善する効果が期待されます。OABの症状には、以下があげられます。



尿意切迫感

急におこる、抑えられないような強い尿意で我慢することがむずかしいもの。



切迫性尿失禁

急におこる、抑えられないような強い尿意で間に合わずもれてしまうもの。台所で食器洗いをしていいる時、玄関先やトイレに入る際に起こることがあります。



頻尿

日中のトイレの回数が多い (昼間頻尿)。
就寝後にトイレのために1回以上起きる (夜間頻尿)。



飲み方について

- このお薬は、4mg、8mgの2種類あります。

フェソテロジンフマル酸塩 徐放錠4mg「サワイ」

原寸大

フェソテロジン
4 サワイ



フェソテロジンフマル酸塩 徐放錠8mg「サワイ」

原寸大

フェソテロジン
8 サワイ



- 通常1日1回4mgで開始しますが、効果が不十分の場合、1日8mgに増量することがあります。自己判断で増量せず、医師に相談し、医師の指示に従ってください。
- 割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのままかまずに服用してください。



副作用と対処法

- このお薬を服用後、以下のような症状があらわれることがあります。

口の中が渴く(口内乾燥)

うがいをしたり、アメをなめるようにしましょう。よく噛んで食べることで唾液が分泌されるので、噛みごたえのあるメニューを選んだり、ガムを噛んだりしましょう。

また、舌を上下・左右、円を描くように右回り・左回りに動かす舌のストレッチも、唾液の分泌に効果的です。



便秘

きちんと朝食を摂ること、ヨーグルトや乳酸菌飲料で腸内環境を整えることで、排便が促されます。

食事は、根菜や果物、キノコや豆類、海藻など、食物繊維やマグネシウムの多い食材をバランスよく摂るようにしましょう。

また、適度な運動を取り入れましょう。



かすみ目、めまい、眠気など

自動車運転など危険を伴う機械を操作する際には注意してください。

