

エルトロンボパグ錠「サワイ」を服用される方へ


エルトロンボパグ錠「サワイ」の飲み方

服用のポイント

- 1日1回、食事の前後2時間を避けて、空腹時に服用してください。
- 毎日決まった時間に服用しましょう。
- ご自身の判断でスケジュールや服用する量を変更したり、服用をやめたりしないでください。



あなたの服用方法



※その他、一緒に服用するときに必要なお薬については、裏面で確認してください。

服用の際の注意事項

エルترونボパグ錠「サワイ」には、一緒に服用するときに注意が必要なお薬があります。

現在服用中のお薬がある場合や、エルترونボパグ錠「サワイ」の服用中に他のお薬を服用する場合は、必ず事前に主治医や薬剤師にご相談ください。

お薬の名称	お薬の種類	想定されること
ロスバスタチン	高コレステロール血症のお薬	ロスバスタチンの副作用が強く出る可能性があります。
ロピナビル・ リトナビル配合剤	HIV感染症のお薬	エルترونボパグ錠「サワイ」の効果が弱くなる可能性があります。
シクロスポリン	免疫を抑制するお薬	エルترونボパグ錠「サワイ」の効果が弱くなる、または強くなる可能性があります。

次のような症状があらわれたら、お薬の服用を中止して、
すぐに主治医に連絡してください。

黄疸（皮膚や白目などが黄色くなる）、疲労感、
体がだるい、力が入らない、吐き気、おう吐、
食欲不振、体のかゆみ、尿の色が濃くなる

肝臓の障害の可能性があります

突然の息切れ、胸の痛み、足の痛み・むくみ、
片側のまひ、頭痛、言葉が出にくい、意識の
低下・消失

けっせんそくせんしょう
血栓塞栓症の可能性があります

この他にも気になる症状があらわれた場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。